29 DE ANI
National
Cotidian fondat în 1997

Studiul care îngroapă vaccinul ROR. A ucis cu 2.657% mai mulți copii decât rujeola

Autor: **Claudia Marcu**

Un studiu amplu realizat de cercetătorii și epidemiologii americani, bazat pe datele statistice din VAERS, sistemul de raportare a reacțiilor adverse, a demonstrat clar că vaccinul ROR a ucis cu 2.657% mai mulți copii decât rujeola însăși. Având în vedere că rata reală de raportare a reacțiilor adverse este de doar 3%, numărul deceselor este însă uriaș. Sindromul morții subite a sugarului a fost categoria cea mai frecvent raportată (24%), urmată de febră (15%), convulsii (12%), stop cardiac (8%), detresă respiratorie (7%) și encefalită (3%).

Studiul ”Decese în urma vaccinării împotriva MMR (ROR) și MMRV (ROR + antivaricelă) în Statele Unite”, al cercetătorilor și epidemiologilor americani, publicat în zenodo.org, a scos la iveală o mortalitate cu 2.657% mai mare în urma vaccinului ROR decât în urma rujeolei. ”Decesele raportate au fost concentrate predominant la copiii sub 2 ani, iar majoritatea au avut loc în primele 14 zile după vaccinare. Sincronizarea grupării specifice vârstei cu momentul imediat post-vaccinare reflectă un model non-aleatoriu de mortalitate. Această preocupare este amplificată și mai mult de contrastul puternic dintre decesele asociate vaccinului raportate și numărul extrem de rar de decese asociate

infecției cu rujeolă în epoca modern”, au arătat autorii studiului, care au avertizat că un vaccin nu ar trebui niciodată să fie mai letal decât boala.

Cifre îngrozitoare

Cercetarea a fost făcută cu ajutorul sistemului de raportare a evenimentelor adverse la vaccin (VAERS), urmărindu-se rapoarte de deces care implică vaccinurile ROR și MMRV până la 29 august 2025. Rezultatele au arătat că un total de 536 de decese asociate cu vaccinarea ROR sau MMRV au fost identificate la nivel global în VAERS, inclusiv 299 de rapoarte din SUA care au cuprins cohorta analitică. Decesele au fost puternic concentrate în copilăria timpurie. Un total de 182 din 299 de rapoarte (60,9%) au avut loc la copii sub 2 ani, cu 156 de decese (52,2%) în special în grupa de vârstă 1,0-1,5 ani corespunzătoare fereastrei de rutină a primei doze. Gruparea temporală după vaccinare a fost pronunțată. Un total de 120 decese (40,1%) au avut loc în decurs de 7 zile și 158 de decese (52,8%) în decurs de 14 zile de la vaccinare.

Moarte subită

Printre decesele survenite în prima săptămână, 68,6% au implicat copii cu vârsta cuprinsă între 1,0-1,5 ani. Majoritatea deceselor (74,6%) au avut loc în contextul vizitelor de vaccinare combinată care au implicat unul sau mai multe vaccinuri suplimentare concomitente, în timp ce 25,4% au urmat administrarea exclusivă a MMR/MMRV. ”Manifestările clinice au fost eterogene, dar au demonstrat tipare recurente. Sindromul morții subite a sugarului (SIDS) sau moartea subită inexplicabilă a fost categoria cea mai frecvent raportată (24%), urmată de febră (15%), convulsii (12%), stop cardiac (8%), detresă respiratorie (7%) și encefalită (3%)”, se arată în studiu.

Subraportare flagrantă

Vizitele la departamentul de urgență au fost documentate în 23,7% din rapoarte, iar internarea în spital în 25,4%, indicând o severitate clinică substanțială care precede decesul. Din 1995, 193 de decese asociate cu MMR/MMRV în SUA, cu date identificabile, au fost raportate către VAERS, în timp ce doar 7 decese asociate cu infecția cu rujeolă au fost documentate în aceeași perioadă – ceea ce reprezintă un număr cu 2.657% mai mare de decese asociate cu vaccinul, au precizat cercetătorii americani. Potrivit acestora, furnizorii de servicii medicale iau inițiativa de a raporta decesele către VAERS atunci când au stabilit că vaccinarea a contribuit la deces, altfel, un astfel de raport nu ar fi depus. Fiind un sistem pasiv, VAERS este supus unei subraportări substanțiale; analizele dintr-un proiect pilot finanțat de CDC care utilizează supravegherea bazată pe dosare medicale

electronice au sugerat că mai puțin de 1% din evenimentele adverse pot fi raportate sistemelor naționale de siguranță a vaccinării, se mai semnalează în studiu.